

☐ **ATENÇÃO:** Há outros exames pendentes.



VETER CENTRO DIAGNÓSTICO
Rua Joaquim Nabuco, 2986 - Dinísio Torres - Fortaleza - CE
(85)3224-8464 / (85) 3264-0937 / (85) 98194-6523 (apenas whatsapp)

LAUDO

NOME	IDADE	ESPÉCIE	RAÇA/CLASSE	SEXO	RG	CHIP/TATUAGEM
SINGULAR'S FAIR PLAY ROCK EWE	2 anos 3 meses 16 dias	CANINA	BORDER COLLIE	F		991001003570198
TUTOR		TELEFONE	FICHA		DATA CADASTRO	
OLIVIER GILLES SOULIER		98600-5147	25948		13/02/2023 11:53	
CLÍNICA		VETERINÁRIO	CRMV		DATA LAUDO	
VETER		ANTÔNIA IRAÍNA MOTA CAMPOS	1839 CE		13/02/2023 14:17	

REGIÃO: ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS

POSICIONAMENTO: Radiografia obtida em projeção ventrodorsal.

ACHADOS RADIOGRÁFICOS:

Ângulos acetabulares, segundo Norberg, medindo em torno de 109° em coxofemoral direita e 105° em coxofemoral esquerda.

Cabeças femorais e acetábulos, direito e esquerdo, congruentes, apresentando espaço articular estreito e regular.

Acetábulos, direito e esquerdo, apresentando boa profundidade com bordos craniolaterais pontiagudas e ligeiramente arredondadas.

Cabeças femorais arredondadas sem sinais de alterações morfológicas.

Colos femorais, bilateralmente, apresentando boa angulação em relação ao eixo longo de fêmur.

Patelas direita e esquerda encaixadas em sulcos trocleares de fêmures sem sinais de luxações.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Aspectos radiográficos sugestivos de articulações sem sinais de displasia coxofemoral (Grau A // H.D.-).

OBSERVAÇÕES:

Exame realizado com o paciente sob contenção química.

REGIÃO: ARTICULAÇÕES UMERORRADIOULNAR DIREITA E ESQUERDA

POSICIONAMENTO: Radiografias obtidas em projeções mediolateral (decúbito lateral direito e esquerdo) e craniocaudal.

ACHADOS RADIOGRÁFICOS:

Manutenção da relação articular entre úmero, rádio e ulna direitos e esquerdos apresentando interlinhas radiográficas regulares e radiotransparentes.

Processo ancôneo de ulna direita e esquerda apresentam-se fundidos dentro dos limites da normalidade radiográfica, sem sinais de não-união.

Processos coronóides medial e lateral de rádio direito e esquerdo dentro dos limites da normalidade radiográfica sem sinais de fragmentações.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Aspectos radiográficos sugestivos de cotovelos livres de displasia.

OBSERVAÇÕES:

Exame realizado com o paciente sob contenção química.

IMAGENS DO LAUDO





Antônia Iraína Mota Campos
CRMV - 1839